

**Prosopis** Fab.

11. **Prosopis globula** ♀ ♂ nov. sp.?

Nigra, ut solito flavo ornata.

Caput breve clypeo sparsius punctato, scuti nasalis parte supera sulcata; mesonotum dense punctulatum, scutellum sparsius; alæ squalido-hyalinæ nervis piceis; segmentum mediale globosum margine laterali, sub aream spiraculiferam incurvato, spatio cordiformi fere lævi, basi tantum ruguloso.

♀ Flava sunt tres vittæ faciei, collare, callum, punctum tegularum, genua, annulum basale tibiæ et plus minus prototarsorum extrema basis.

♂ Flava sunt facies sub antennis (suturis aliquando nigris), genua, annulo tibiæ, prototarsique toti. Scapus haud dilatatus, postice planatus. — Long.: 6 millimètres; ala : 5,5 millim. Une ♀ et trois ♂.

Espèce voisine de *Pros. indistincta* Mor. de la Chine septentrionale, mais à abdomen plus lisse et à tégument plus teint de flave.

---

NOTE SUR QUELQUES INSECTES DU TONKIN  
PROVENANT DES ENVIRONS DE HANOÏ,

PAR M. J. DE CLAYBROOKE.

En 1902, M. Pouchat, professeur d'agriculture à Hanoï, a envoyé à M. le prof. Oustalet un certain nombre d'insectes récoltés dans les environs de Hanoï et, pour quelques-uns d'entre eux, il a joint à cet envoi des notes intéressantes sur leurs mœurs, les dégâts qu'ils commettent ou les usages qu'on en tire dans le pays.

Il n'est peut-être pas inutile d'en donner ici une première liste, avec l'indication des espèces plus ou moins rares, manquantes ou insuffisamment représentées dans les collections du Muséum. Nous présenterons à l'une des prochaines séances une deuxième liste, comprenant des espèces de Coléoptères et de Lépidoptères nuisibles. Les déterminations sont dues à l'obligeance habituelle de MM. Poujade, du Buysson et Martin.

**Lépidoptères.**

PAPILIO AGAMEMNON Lin.

PAPILIO ERITHONIUS Cram.

PIERIS ALBINA Bsd.

CALLIDRYAS PHILIPPINA Cram.

DELIAS AGOSTINA Hewitson. — Cette espèce manque dans les collections du Muséum. Nous demandons à M. Pouchat de vouloir bien nous en envoyer quelques exemplaires.

HERONA MARATHUS Doubleday.

JUNONIA LAOMEDIA Linn.

— ASTERIA Linn.

— ORYTHYA Linn.

— ALMANA Linn.

ARGYNNIS NIPHE Linn.

DANAIS PLEXIPPUS Linn.

— SIMILIS Linn. (*aventiaa*, Gram.).

EUPLOEA GODARTII Boisd.

— BURMEISTERI Boisd.

MELANITIS LEDA Linn.

#### Hyménoptères.

XYLOCOPA DISSIMILIS Lep.

POLISLES HEBREUS F.

— SAGITTARIUS H. de Sauss.

— SCHACH F.

#### Hémiptères.

SCUTELLERA NOBILIS Fabr.

DYSDERCUS CINGULATUS Fabr. Très abondant sur les Cotonniers; mais ne paraît causer aucun dégât.

BELOSTOMA INDICUM Lep. et Serv. Très abondant dans les mares et les arroyos. Les indigènes le coupent en morceaux très fins et les mêlent à la saumure de Poissons, à laquelle, paraît-il, ils communiquent une odeur très agréable.

PHYMA IMITATA. Il n'en existe qu'un seul exemplaire dans les collections du Muséum. La larve se recouvre d'un épais duvet blanchâtre. Les Jujubiers, en particulier, sont très souvent envahis par ces Insectes qui les amènent à un état de dépérissement général. Les bassinages à l'eau additionnée de jus de tabac suffisent pour la destruction de ce parasite.

---

DESCRIPTIONS D'ARACHNIDES NOUVEAUX DE MADAGASCAR,  
FAISANT PARTIE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM,

PAR M. E. SIMON.

**Myrtale Alluaudi**, nov. sp. — ♀ long. 5 millimètres.

Cephalothorax fusco-piceus, reticulatus et nitidus, fovea tubere oculorum paulo angustiore, leviter recurva, tenui sed utrinque leviter ampliata, sulco medio brevissimo. Oculi quatuor antici inter se subæquales. Oculus lateralis posticus antico vix minor. Oculus medius posticus reliquis minor, a laterali postico contiguus. Pars labialis spinulis acutis 5 vel 6 iniquis et inordinatis munita. Coxa